



Pic de la Guadeloupe *Melanerpes herminieri*



AUTRES NOMS : tapeur, tapé, toto bwa, toctoc

DESCRIPTION : bec fin et long, plumage de couleur noire, gorge et ventre rouge sang, dos noir bleuté. Le mâle a un bec plus long que la tête contrairement à la femelle. Les ailes sont d'un aspect bleu métallique. Les pattes sont gris vert et possèdent des griffes bien développées. Les individus vivant en Basse-terre sont plus grands que ceux vivant en Grande-Terre. Taille: 26 à 28 cm.

RÉPARTITION : Guadeloupe

ÉCOLOGIE : Il vit dans tous les milieux forestiers de Guadeloupe, forêt humide, mésophile, marécageuse et mangrove. Il se nourrit de petits insectes (termites, fourmis, myriapodes), de grands insectes (orthoptères, coléoptères) ainsi que de fruits. Il est territorial et a besoin d'un espace minimum de 2 ha.

BIOLOGIE : Il se déplace sur de courtes distances en glissades ondulées. Il est sédentaire et endémique à la Guadeloupe. La saison de reproduction s'étend de février à août. Les deux parents creusent le nid qui n'est utilisé généralement que 2 ou 3 ans mais parfois jusqu'à 5 ans. Les parents élèvent 3 petits qui restent avec eux jusqu'à la prochaine saison de reproduction. Un pic noir vit en moyenne 8 à 10 ans. Il signale sa présence à grand coups de bec sur les troncs des arbres morts de façon rapide et répétée pendant un court instant.

PROTECTION / MENACES : Le pic de la Guadeloupe est classé dans la liste des oiseaux menacés avec un risque élevé d'extinction à l'état sauvage à court terme. La principale menace est la déforestation forestière (urbanisation, production de charbon de bois) et la fragmentation de son habitat. Les pesticides, la prédation des rats sur les jeunes pics et le braconnage sont d'autres menace. Il est placé sur la Liste régionale de Guadeloupe des espèces protégées et sur le Livre Rouge des DOM-TOM.